



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE

Uge 27b, 2017

EUROPA	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien	A	A	A	ABs
Bosnien-Hercegovina	A	A	ABf	ABfs
Bulgarien	A	A	ABf	ABfrs
Estland		A	Af	ABfrs
Hviderusland	A	A	ABf	ABfrs
Kroatien		A	Af	ABfs
Letland		A	Af	ABfrs
Litauen		A	Af	ABfrs
Makedonien		A	Af	ABfs
Moldova	A	A	ABf	ABfrs
Montenegro		A	ABf	ABfs
Polen		A	Af	ABfrs
Rumænien	A	A	ABf	ABfrs
Rusland	A	A	Aj ⁷ ₉ Bf	Aj ⁷ ₉ Bfrs
Serbien		A	ABf	ABfs
Slovakiet		A	Af	ABfs
Slovenien		A	Af	ABf
Tyrkiet	A	A	A	ATBrs
alm. turistområder	A	A	A	ATBs
Tjekkiet		A	Af	ABf
Ukraine	A	A	ABf	ABfrs
Ungarn		A	Af	ABfs
CARIBIEN				
Anguilla (GB)	A	A	A	ATB
Antigua og Barbuda	A	A	A	ATB
Aruba	A	A	A	ATB
Bahamas	A	A	A	ATB
Barbados	A	A	A	ATB
Bermuda (GB)	A	A	A	ATB
Caymanøerne (GB)	A	A	A	ATB
Cuba	A	A	A	ATBr
Dominica	A	A	A	ATB
Dominikanske Republik	Av	Av	ABv	ATBrsv
Grenada	A	A	A	ATB
Guadeloupe (FR)	A	A	A	ATB
Haiti	AX/N	AX/N	ABX/N	ATBrsvX/N
Jamaica	A	A	A	ATB
Jomfruøerne (GB og USA)	A	A	A	ATB
Martinique (FR)	A	A	A	ATB
Montserrat	A	A	A	ATB
Nederlandske Antiller	A	A	A	ATB
Puerto Rico (USA)	A	A	A	ATB
Saint Kitts and Nevis	A	A	A	ATB
Saint Lucia	A	A	A	ATB
St. Vincent og Grenadinerne	A	A	A	ATB
Trinidad og Tobago	Ag*	Ag*	Ag*	Ag*TB
Turks- og Caicosøerne (GB)	A	A	A	ATB
MELLEM- og SYDAMERIKA				
Argentina	A	A	A	ATBs
Grænseomr. Bolivia, Brasilien og Paraguay	A	AG*V	AG*V	AG*TBsv
Belize	Av	Av	Abv	ATBrsv
Bolivia	Ag	Agv	AgBv	AgTBrsv
Amazonas	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N
Brasilien (gul feber p.t. alle rejsende)	A	AG	AGB	AGTBrs
Amazonas	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N

Vaccinationsforslagene er gennemgribende opdateret i forhold til malariaprophylakse, se EPI-NYT 27a/17. Alle rejsende bør være vaccineret mod difteri og tetanus, symboler herfor er derfor ikke medtaget i tabellen.

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene opdelt i fire kategorier:

1. Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby.
2. Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3/4**, fx med B ved seksuel kontakt med lokale, T ved udtalt dårlig hygiejne, M ved tæt lokal personkontakt, j ved insekteksposition (trekkingtur).
3. Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsækrejse.
4. Langvarig individuel rejse i halve år, indvandrere på familiebesøg (uanset rejsens varighed), udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme.

Symbolernes typografi

STORE BOGSTAVER er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; små bogstaver, når der er tale om begrænset anvendelse. Malaria prophylakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. Således henviser f, g, j, r, s til vaccination af udvalgte rejsende, og **v, x, x/n** henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet, se www.ssi.dk/rejser. **N/n** markerer nødbehandling, se senere. Sæsonvariation er angivet med tal. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er den aktuelle periodes første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan **x⁵₁₁**. Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprophylakse

X: Atovaquon/proguanil eller doxycyklin
N/n: Nødbehandling OG myggestikprophylakse



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Chile	A	A	A	ATBs
Colombia	Ag*	Ag*x/n	Ag*Bx/n	Ag*TBrsx/n
Amazonas	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N
Costa Rica	A	A	AB	ATBr
Ecuador	A	Ag*x/n	Ag*Bx/n	Ag*TBrsx/n
Amazonas	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N
Galapagosøerne	A	A	A	ATB
El Salvador	A	Av	ABv	ATBrsv
Fransk Guyana	AG	Agx/n	AGBx/n	AGTBrsx/n
Guatemala	A	Av	ABv	ATBrsv
Guyana	AG	Agx/n	AGBx/n	AGTBrsx/n
Honduras	AV	Av	ABv	ATBrsv
Mexico	A	Av	ABv	ATBrsv
Nicaragua	Av	Av	ABv	ATBrsv
Panama	A	Agx/n	AGBx/n	AgTBrsx/n
Paraguay	AG	AGv	AGv	AGTBrsv
Peru	A	Ag*v	Ag*Bv	Ag*TBtrsv
Amazonas (Loreto)	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N
Surinam	AG	AGx/n	AGBx/n	AGTBrsx/n
Uruguay	A	A	A	ATBs
Venezuela	Ag*	Ag*v	Ag*Bv	Ag*TBrsv
Amazonas, Bolivar	AGX/N	AGX/N	AGBX/N	AGTBrsX/N
Margarita	A	A	A	ATB
OCEANIEN				
Carolinerne	A	A	AB	ATBs
Christmas Island (AU)	A	A	AB	ATBs
Cocos Islands(AU)	A	A	AB	ATBs
Cookøerne	A	A	AB	ATBs
Fiji	A	A	AB	ATBs
Fransk Polynesien	A	A	AB	ATBs
Guam (USA)	A	A	AB	ATBs
Kiribati	A	A	AB	ATBs
Mikronesien	A	A	AB	ATBs
Nauru	A	A	AB	ATBs
Niue	A	A	AB	ATBs
Nordmarianere	A	A	AB	ATBs
Ny Kaledonien (FR)	A	A	AB	ATBs
Papua Ny Guinea	AX	AX	ABX	ATBsX
Pitcairn	A	A	AB	ATBs
Salomonøerne	AX	AX	ABX	ATBsX
Samoa	A	A	AB	ATBs
Tokelau (NZ)	A	A	AB	ATBs
Tonga	A	A	AB	ATBs
Tuvalu	A	A	AB	ATBs
Vanuatu	AX	AX	ABX	ATBsX
Wake Island (USA)	A	A	AB	ATBs
Wallis og Futunøerne (FR)	A	A	AB	ATBs
AFRIKA				
Algeriet	A	A	AB	ATBrsv
Angola	AGX	AGX	AGBX	AGTBrsX
Benin	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsv
Botswana	A	Ax ¹¹ ₆	ABx ¹¹ ₆	ATBrsv ¹¹ ₆
Burkina Faso	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsv
Burundi	AGX	AGX	AGBX	AGTBrsX
Cameroun	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsv
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsv
Chagosøerne (GB)	A	A	AB	ATBrsv

Symbolforklaring

- A:** Hepatitis A (fra 1 år). Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK før besøg i oprindelseslandet. Immunglobulin kan gives til børn <1 år.
- B:** Hepatitis B (fra fødslen). Re-vaccination anbefales ikke, EPI-NYT 11/13.
- f:** Centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovsområder i sommerhalvåret.
- g/G:** Gul feber (fra 9 måneder).
- g/G*:** Gul feber evt. kun ved særlig risiko. Se under de enkelte lande på www.ssi.dk/rejser.
- j:** Japansk encephalitis (fra 2 mdr.), EPI-NYT 10/13, 26a/15 og 27a/17.
- M:** Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 6 uger, EPI-NYT 27a/17). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 27a/17.
- r:** Rabies, se EPI-NYT 37/10 og 6/16.
- s:** Tuberkulose. BCG til børn (fra fødslen og op til 11-12 år) til høj-endemiske områder, hvis der er længerevarende tæt kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår, EPI-NYT 27a/17.
- T:** Tyfus. Injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år. Indvandrere på besøg hos slægt og venner foreslås vaccineret uanset varighed.

Malariaprophylakse:

- V:** Meget lille risiko, myggestikprophylakse tilstrækkeligt.
- Q:** Klorokin, alternativt **V** eller **X**, alt efter smitterisiko.
- X:** Atovaquon/proguanil eller doxycyklin.
- N:** Nødbehandling med atovaquon/proguanil.

Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 5a/15.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, EPI-NYT 6/11.

Udvalgte insektoverførte virus-sygdomme, EPI-NYT 6/12.

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprophylakse

X: Atovaquon/proguanil eller doxycyklin
N/n: Nødbehandling OG myggestikprophylakse



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Comorerne	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Congo	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Dem. Rep. Congo (Zaire)	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Djibouti	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Egypten	A	A	AB	ATBrS
Elfenbenskysten	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Eritrea	Ag* ^X	Ag* ^{MX}	Ag* ^{MB} X	Ag* ^{MT} BrS ^X
Asmara	A	AM	AMB	AMTBrS
Etiopien	Ag* ^X	Ag* ^{MX}	Ag* ^{MB} X	Ag* ^{MT} BrS ^X
Addis Abeba	AG	AGM	AGMB	AGMTBrS
Gabon	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Gambia	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Ghana	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Guinea	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Guinea-Bissau	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Kap Verde	A	Av ⁸ ₁₁	ABv ⁸ ₁₁	ATBrsv ⁸ ₁₁
Kenya	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Nairobi	Ag*	Ag*	Ag*B	Ag* ^T BrS
Lesotho	A	A	AB	ATBrS
Liberia	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Libyen	AM	AM	ABM	AMTB
Madagaskar	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Malawi	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Mali	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Marokko	A	A	AB	ATBrS
Mauretanien	Ag ^x	Ag ^x	AgB ^x	AgTBrS ^x
Mauritius	A	A	AB	ATBs
Mayotte (FR)	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Mozambique	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Namibia	A	A ^x	AB ^x	ATBrS ^x
Niger	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Nigeria	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Réunion (FR)	A	A	AB	ATBrS
Rwanda	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
São Tomé og Príncipe	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Senegal	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Seychellerne	A	A	AB	ATBs
Sierra Leone	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
Somalia	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Sudan	Ag ^X	AgM ^X	AgMB ^X	AgMTBrS ^X
Swaziland	A ^x	A ^x	AB ^x	ATBrS ^x
Sydafrikanske Republik	A	A ^x	AB ^x	ATBrS ^x
Sydsudan	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Tanzania	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Tchad	Ag ^X	AgM ^X	AgMB ^X	AgMTBrS ^X
Togo	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Tunesien	A	A	AB	ATBrS
Uganda	AGX	AGM ^X	AGMB ^X	AGMTBrS ^X
Zambia	Ag* ^X	Ag* ^X	Ag* ^B X	Ag* ^T BrS ^X
Zimbabwe	AX	AX	ABX	ATBrS ^X
Harare, Bulawayo	A	A	AB	ATBrS
Ækvatorialguinea	AGX	AGX	AGBX	AGTBrS ^X
ASIEN				
Afghanistan	A	A(T) ^x ₁₁	ATB ^x ₁₁	ATBrS ^x ₁₁
Arabiske Emirater	A	A	AB	ATBr
Armenien	A	A	AB	ATBrS
Aserbajdsjan	A	Av ⁶ ₁₀	ABv ⁶ ₁₀	ATBrsv ⁶ ₁₀

Koleravaccination

Vaccination foreslås ikke til beskyttelse mod almindelig rejse-diarré. Vaccination kan være relevant ved ophold i områder med udbrud af kolera.

Særlige myndighedskrav

Nogle lande kræver vaccination mod gul feber for alle rejsende, se www.who.int/ith. Ophold/transit i lande, hvor gul feber kan forekomme, kan også medføre vaccinationskrav senere på rejsen (gul feber transmissionszone, se www.ssi.dk/rejser).

Ifølge WHO kan intet land kræve revaccination af tidligere gul feber vaccinerede, EPI-NYT 27a/16. Meningokok-vaccination mod gruppe A+C+W135+Y kræves ved pilgrimsrejse til Saudi-Arabien. Menveo[®] kan gives fra 1 år og Nimenrix[®] fra 6-ugers-alder, EPI-NYT 27a/17.

Malariaprofylakse

Primær forebyggelse af myggestik med balsam/net/spray er altid vigtig ved ophold i et malariaområde. Her omtales to forskellige medikamentelle profylakseregimer (nødbehandling, se nedenfor): Atovaquon/proguanil er effektivt over for *P. falciparum*. Resistens ses meget sjældent. Bør ikke anvendes til gravide og ammende kvinder, EPI-NYT 26a/13. For dosering til børn på 5-10 kg, se EPI-NYT 7-8/16.

Doxycyklin er effektivt over for *P. falciparum*. Doxycyklin er kontraindiceret til gravide efter 10. graviditetsuge og til børn < 8 år, EPI-NYT 26a/13 og 7-8/16.

Nødbehandling af malaria

I nogle områder i Sydøstasien og i Mellem- og Sydamerika er risikoen for malaria generelt så lav, at man som alternativ til kemoprofylakse kan medgive den rejsende malarimedisin til nødbehandling, hvis denne får feber eller andre symptomer på malaria, EPI-NYT 27a/17. De lande/områder, hvor nødbehandling kan overvejes, er markeret med **n/N** i tabellerne. Dette forudsætter, at den rejsende medbringer et termometer ved ophold i områder med risiko for

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprofylakse

X: Atovaquon/proguanil eller doxycyklin
N/n: Nødbehandling OG myggeprofylakse



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Bahrain	A	A	AB	ATBs
Bangladesh	Av	A(T)x	Aj ⁵ ₁₀ TBrx	Aj ⁵ ₁₀ TBrsx
Dhaka	A	A(T)	Aj ⁵ ₁₀ TBr	Aj ⁵ ₁₀ TBrS
Bhutan	A	A(T)x	Aj ⁶ ₁₀ TBrx	Aj ⁶ ₁₀ TBrsx
Brunei	A	Av	AjBv	AjTBsv
Cambodja	Av	AX/N	Aj ⁵ ₁₀ BrX/N	Aj ⁵ ₁₀ TBrSx/N
Angkor Wat, Tonle Sap	A	Av	Aj ⁵ ₁₀ Brv	Aj ⁵ ₁₀ TBrsv
Filippinerne	A	Ax/n	AjBx/n	AjTBrsx/n
Georgien	A v ⁶ ₁₀	Av ⁶ ₁₀	ABv ⁶ ₁₀	ATBrsv ⁶ ₁₀
Indien, nord	Av	A(T)v	Aj ⁵ ₁₀ TBrv	Aj ⁵ ₁₀ TBrsv
Indien, mellem-øst	Av	A(T)x	Aj ⁵ ₁₀ TBrX	Aj ⁵ ₁₀ TBrSx
Indien, syd og vest inkl. Goa	Av	A(T)v	AjTBrv	AjTBrsv
Indonesien	A	Ax/n	AjBx/n	AjTBrsx/n
Papua	AX	AX	AjBX	AjTBsX
Bali, Java (turistomr.)	A	A	AjB	AjTBs
Irak	A	AT	ATB	ATBrS
Iran	A	Ax ³ ₁₁	ABx ³ ₁₁	ATBrsx ³ ₁₁
Israel	A	A	AB	ATBr
Japan			j ⁷ ₁₀ B	j ⁷ ₁₀ B
Jordan	A	A	AB	ATBr
Kasakstan	A	A	AB	ATBrS
Kina	A	A	Aj ⁶ ₁₀ B	Aj ⁶ ₁₀ TBrS
Kina, områder af Tibet	A	Av	Aj ⁶ ₁₀ Bv	Aj ⁶ ₁₀ TBrsv
Yunnan	Ax	Ax	Aj ⁶ ₁₀ Bx	Aj ⁶ ₁₀ TBrSx
Hong Kong	A	A	AB	ATBs
Macao	A	A	AB	ATB
Kirgisistan	A	Av ⁶ ₁₀	ABv ⁶ ₁₀	ATBrsv ⁶ ₁₀
Kuwait	A	A	AB	ATBs
Laos	Av	Ax/n	Aj ⁶ ₉ Bx/n	Aj ⁶ ₉ TBrSx/n
Vientiane	A	A	Aj ⁶ ₉ B	Aj ⁶ ₉ TBrS
Libanon	A	A	AB	ATBr
Malaysia	A	Av	AjBv	AjTBrsv
Sabah og Sarawak	A	Ax/n	AjBx/n	AjTBsxn
Maldiverne	A	A	AB	ATBs
Mongoliet	A	A	AB	ATBrS
Myanmar (Burma)	A	Ax/n	Aj ⁵ ₁₀ Brx/n	Aj ⁵ ₁₀ TBrSx/n
Nepal	A	A(T)v	Aj ⁶ ₁₀ TBrv	Aj ⁶ ₁₀ TBrsv
Nordkorea	A	Av	Aj ⁵ ₁₀ Bv	Aj ⁵ ₁₀ TBrsv
Oman	A	Av	ABv	ATBrv
Pakistan	AX	A(T)x	Aj ⁵ ₁₀ TBrX	Aj ⁵ ₁₀ TBrSx
Qatar	A	A	AB	ATB
Saudi-Arabien	A	Ax ⁹ ₁	ABx ⁹ ₁	ATBsx ⁹ ₁
Mekka (pilgrimsrejse)	AM	AM	AMB	AMTBs
Singapore	A	A	AB	ATBs
Sri Lanka	A	A(T)v	AjTBrv	AjTBrsv
Syd Korea	A	Av	Aj ⁵ ₁₀ Bv	Aj ⁵ ₁₀ Bsv
Syrien	A	A	AB	ATBrS
Taiwan	A	A	Aj ⁵ ₁₀ B	Aj ⁵ ₁₀ TBs
Tadsjikistan	A	Av ⁶ ₁₀	ABv ⁶ ₁₀	ATBrsv ⁶ ₁₀
Thailand	A	Ax/n	Aj ⁵ ₁₀ Brx/n	Aj ⁵ ₁₀ TBrSx/n
alm. turistområder	A	Av	Aj ⁵ ₁₀ Brv	Aj ⁵ ₁₀ TBrsv
Turkmenistan	A	A	AB	ATBrS
Usbekistan	A	Av ⁵ ₉	ABv ⁵ ₉	ATBrsv ⁵ ₉
Vietnam	A	Av	Aj ⁵ ₁₀ Bv	Aj ⁵ ₁₀ TBrsv
Yemen	Av	Ax	ABx	ATBrSx
Østtimor	AX	AX	AjBX	AjTBrsX

malaria, at der konsekvent anvendes en effektiv myggestiksprofylakse, og at den rejsende først starter nødbehandling, når denne er blevet undersøgt af en læge og fået påvist malariaparasitter i en blodprøve.

Den rejsende bør også kontakte sit forsikringsselskab for råd om, hvor malaria kan behandles mest kvalificeret.

Det er vigtigt at understrege, at nødbehandling ikke altid vil udgøre en kurativ malariabehandling.

Nødbehandlingens primære formål er at sikre, at den rejsende uden unødigt forsinkelse kan få et virksomt og kvalitetssikret lægemiddel, og fordi der er en reel risiko for, at lokalt købt malariamedicin kan være virkningsløst.

Endeligt er det vigtigt at være opmærksom på, at særlige grupper af rejsende, fx indvandrere, som tager på familiebesøg i oprindelseslandet, rejsende på trekking med overnatning i visse jungle- og sumpområder og rygsæksrejsende med længerevarende og ikke fastlagt rejserute, kan være i særlig risiko for at få malaria og derfor kræver ekstra omhyggelig rådgivning.

Som nødbehandling foreslås atovaquon/proguanil (voksne: 4 tabletter dagligt i tre dage sammen med et fedtholdigt måltid).

Rejsemedicin på internettet

Aktuel information om udbrud og mere detaljeret information om de enkelte lande og sygdomme kan fx søges her:

www.ssi.dk/rejser

www.um.dk

www.who.int/ith

www.cdc.gov/travel

www.promedmail.org

(C.S. Larsen, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, A.H. Christiansen, Afdeling for Infektionsepidemiologi).

5. juli 2017

X: Atovaquon/proguanil eller doxycyklin

N/n: Nødbehandling OG myggestikprofylakse

A: Hepatitis A

B: Hepatitis B

f: FSME/TBE

g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko

j: Japansk encephalitis

M: Meningokok A+C+W135+Y

r: Rabies

s: Tuberkulose

T: Tyfus

(T): Tyfus >2 uger

V: Myggestikprofylakse