



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE, DEL II

Uge 22b, 2002

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Comorerne	AX	ADX	ADTBX	ADTBrsX
Congo (Brazzaville)	GX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Dem. Rep. Congo (Zaire)	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Djibouti	AX	ADX	ADMTBX	ADMTBrsX
Egypten		ADv ⁶ ₁₀	ADTBv ⁶ ₁₀	ADTBrsv ⁶ ₁₀
Elfenbenskysten	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Eritrea	AX	ADX	ADMTBX	ADMTBrsX
Etiopien	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Adis Abeba	AG	AGDM	AGDMTB	AGDMTBrs
Gabon	GX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Gambia	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Ghana	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Guinea	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Guinea-Bissau	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Kap Verde Rep.		ADv ⁹ ₁₁	ADTBv ⁹ ₁₁	ADTBsv ⁹ ₁₁
Kenya	GX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Nairobi	G	AGD	AGDTB	AGDTBrs
Lesoto	A	AD	ADTB	ADTBrs
Liberia	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Libyen		AD	ADTB	ADTBrs
Madagaskar	AX	ADX	ADTBX	ADTBrsX
Malawi	AX	ADX	ADTBX	ADTBrsX
Mali	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Marokko		ADv ⁵ ₉	ADTBv ⁵ ₉	ADTBrsv ⁵ ₉
Mauretanien	Au	AGDu	AGDMTBu	AGDMTBrsu
Mauritius		ADv	ADTBv	ADTBrsv
Mayotteøerne (Fr)	X	ADX	ADTBX	ADTBrsX
Mozambique	AX	ADMX	ADMTBX	ADMTBrsX
Namibia		ADu	ADTBu	ADTBrsu
Niger	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Nigeria	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Reunion (Fr)		AD	ADTB	ADTBrs
Rwanda	AGX	AGDMTX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Sao Tomé/Principe	AGX	AGDX	AGDTBX	AGDTBrsX
Senegal	GX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Seychellerne		AD	ADTB	ADTBrs
Sierra Leone	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Somalia	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Sudan	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Swaziland	x	ADx	ADTBx	ADTBrsx
Sydafrikanske Rep.		ADx	ADTBx	ADTBrsx
Tanzania	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Tchad	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Togo	AGX	AGDMX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Tunesien		AD	ADTB	ADTBrs
Uganda	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
Zambia	AX	ADMX	ADMTBX	ADMTBrsX
Zimbabwe	X	ADX	ADTBX	ADTBrsX
Harare, Bulawayo		AD	ADTB	ADTBrs
Ækvatorial Guinea	AGX	AGDX	AGDMTBX	AGDMTBrsX
ASIEN:				
Afghanistan	AD	ADU ⁵ ₁₁	ADTBu ⁵ ₁₁	ADTBrsu ⁵ ₁₁
Arabiske Emirater		ADv	ADTBv	ADTBrsv
Armenien	D	ADv ⁶ ₁₀	ADTBv ⁶ ₁₀	ADTBrsv ⁶ ₁₀
Azerbajjan	D	ADv ⁶ ₉	ADTBv ⁶ ₉	ADTBrsv ⁶ ₉

A: Hepatitis A	G: Gul feber	r: Rabies	Q: Klorokin
B: Hepatitis B	J: Japansk encephalitis	s: Tuberkulose	U: Klorokin + proguanil
D: Difteri	M: Meningokok A+C	T: Tyfus	X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
f: FSME/TBE	M*: Meningokok A+C+W135+Y	V: Myggstiksprøylakse	Z: Doxycyklin/Malarone

Koleravaccination

Koleravaccination med oral vaccine kan i sjældne tilfælde være indiceret, se EPI-NYT 44/98.

Koleravaccination kræves ikke længere officielt af noget land.

Særlige myndighedskrav

Ophold/transit i lande, hvor gul feber kan forekomme, kan medføre vaccinationskrav senere på rejsen (se gul feberkort, EPI-NYT 23/01).

Meningokokvaccination mod gruppe A+C+W135+Y kræves ved pilgrimsrejse til Saudi-Arabien, for børn allerede fra 3-måneders alderen, EPI-NYT 45/01.

Malariaprofylakse

Vigtigst er primær forebyggelse af myggestik med balsam/net/spray. Her omtales fem forskellige medikamentelle profylakseregimer:

Klorokin anvendes ved lav risiko for falciparum-malaria eller ved høj følsomhed for klorokin. Midlet tåles af gravide og børn.

Klorokin+proguanil anvendes ved høj risiko for falciparum-malaria med nedsat følsomhed for klorokin. Midlerne tåles af gravide og børn.

Meflokin er kontraindiceret til gravide, og graviditet bør undgås de første 3 måneder efter meflokinindtagelse.

Meflokin bør ikke anvendes profylaktisk til børn under 15 kg samt til personer med epilepsi eller tidligere neuropsykiatrisk lidelse.

Når meflokin pga. ovenstående begrænsninger ikke kan anvendes, kan doxycyklin eller Malarone anvendes alternativt.

Doxycyklin er effektivt overfor stammer af *P. falciparum* med resistens mod andre malarimidler.

Doxycyklin er kontraindiceret til gravide og børn under 12 år, EPI-NYT 19-20/02.

	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Bahrain		A	ADTB	ADTBs
Bangladesh	A	AU	ADJ ⁶ ₁ MTBrU	ADJ ⁶ ₁ MTBrSU
Sydøstlige del	AX	AX	ADJ ⁶ ₁ MTBrX	ADJ ⁶ ₁ MTBrSX
Bhutan	A	Au	ADJ ⁶ ₁ MTBru	ADJ ⁶ ₁ MTBrSU
Brunei		A	ADJTB	ADJTBs
Cambodia	A	Az	ADJ ⁵ ₁₀ TBrz	ADJ ⁵ ₁₀ TBrsz
Cypern		A	ADT	ADTB
Filippinerne		Au	ADJTBu	ADJTBrsu
Georgien	D	ADq ⁷ ₁₀	ADTBq ⁷ ₁₀	ADTBrsq ⁷ ₁₀
Indien, nord	v	Au	ADJ ⁶ ₁ TBrU	ADJ ⁶ ₁ MTBrSU
Indien, syd	v	Au	ADJTBru	ADJTBrsu
Indonesien		AU	ADJTBu	ADJTBrsU
Irian Jaya	X	AX	ADJTBX	ADJTBsX
Jakarta, Bali		A	ADJTB	ADJTBs
Irak		Aq ⁵ ₁₁	ADTBq ⁵ ₁₁	ADTBrsq ⁵ ₁₁
Iran		Au ³ ₁₁	ADTBu ³ ₁₁	ADTBrsu ³ ₁₁
Israel		A	ADTB	ADTB
Japan			ADJ ⁴ ₁₀ T	ADJ ⁴ ₁₀ TB
Jordan		A	ADTB	ADTB
Kazakstan	D	AD	ADTB	ADTBrs
Kina, nord		A	ADTB	ADTBrs
Kina, syd		Av	ADJ ⁴ ₁₀ TBv	ADJ ⁴ ₁₀ TBrsv
Hainan, Yunnan	X	AX	ADJ ⁴ ₁₀ TBX	ADJ ⁴ ₁₀ TBrSX
Hong Kong		A	ADTB	ADTBs
Kirgisien	D	AD	ADTB	ADTBrs
Kuwait		A	ADTB	ADTBrs
Laos	A	Ax	ADJ ⁵ ₁₀ TBx	ADJ ⁵ ₁₀ TBrsx
Libanon		A	ADTB	ADTB
Macao (Port)		A	ADTB	ADTB
Malaysia		A	ADJTB	ADJTBs
Sarawak		Au	ADJTBu	ADJTBrsu
Sabah		AX	ADJTBX	ADJTBsX
Maldiverne		A	ADTB	ADTBs
Mongolske Rep.		A	ADTB	ADMTBrS
Myanmar (Burma)	AZ	AZ	ADJ ⁵ ₁₀ MTBrZ	ADJ ⁵ ₁₀ MTBrSZ
Nepal	A	Av	ADJ ⁷ ₁₂ TBrv	ADJ ⁷ ₁₂ MTBrsv
Nordkorea	A	Av	ADJ ⁵ ₁₀ TBv	ADJ ⁵ ₁₀ TBsv
Oman		Av	ADTBv	ADTBrsv
Pakistan	U	AU	ADJ ⁶ ₁ TBrU	ADJ ⁶ ₁ MTBrSU
Qatar		A	ADTB	ADTB
Saudi Arabien		Au	ADTBu	ADTBrsu
Mekka (Haj)	M*	M*	ADM*TB	ADM*TBs
Singapore		A	ADTB	ADTBs
Sri Lanka		AU	ADJTBru	ADJTBrsU
Sydkorea		Av	ADJ ⁷ ₁₀ TBv	ADJ ⁷ ₁₀ TBsv
Syrien		Aq ⁵ ₁₀	ADTBq ⁵ ₁₀	ADTBrsq ⁵ ₁₀
Taiwan		A	ADJ ⁴ ₁₀ TB	ADJ ⁴ ₁₀ TBs
Tajikistan	D	ADq ⁶ ₁₀	ADTBq ⁶ ₁₀	ADTBrsq ⁶ ₁₀
Thailand		Az	ADJ ⁵ ₁₀ TBrz	ADJ ⁵ ₁₀ TBrsz
alm. turistområder		A	ADJ ⁵ ₁₀ TB	ADJ ⁵ ₁₀ TBs
Turkmenistan	D	ADv ⁶ ₉	ADTBv ⁶ ₉	ADTBrsv ⁶ ₉
Tyrkiet		Aq ⁵ ₁₀	ADTBq ⁵ ₁₀	ADTBrsq ⁵ ₁₀
alm. turistområder		A	ADT	ADTBs
Uzbekistan	D	Adv	ADMTBv	ADMTBrsv
Vietnam		Ax	ADJ ⁵ ₁₀ TBx	ADJ ⁵ ₁₀ TBrsx
Yemen	A	AU	ADTBu	ADTBrsU

Malarone er effektivt overfor stammer af *P. falciparum* med resistens mod andre malaria-midler. Malarone bør såvidt muligt ikke anvendes til gravide og kan ikke anbefales til ammende kvinder, EPI-NYT 51/98 og 19-20/02. Behandling af børn, EPI-NYT 19-20/99 og 19-20/02.

Selvbehandling af malaria

Ved ophold i længere tid i risikoområder, hvor lægehjælp eller medicin ikke kan forventes at være tilgængelig, kan der medgives medicin til selvbehandling. Der bør vælges et middel, der ikke er indgået i profylaksen:

Har man anvendt klorokin evt. kombineret med proguanil, foreslås meflokin/Malarone, alternativt Fansidar (sulfadoxin + pyrimethamin).

Har man anvendt meflokin, kan tages Malarone. Alternativt kan anvendes Artemisinin, der er et nyt malariamiddel, der anvendes til behandling i dele af Afrika og Asien. Præparatet er ikke registreret i Danmark. Halofantrin findes i mange lande, men bør ikke anvendes, EPI-NYT 25/95.

Kinin bør kun undtagelsesvist anvendes til selvbehandling, EPI-NYT 19-20/02.

Rejsemedicin på Internettet

Aktuel information om udbrud og mere detaljeret information om de enkelte lande og sygdomme kan søges på følgende adresser:

www.cdc.gov/travel
www.fitfortravel.scot.nhs.uk
www.who.int/emc/disease-outbreak-news/index.html
www.promedmail.org/pls/promed/promed.home
www.um.dk/aspfiles/rejsevejledninger_liste.asp

(P. Andersen, G. H. Kock-Hansen, Epid. afd., E. Petersen, Afd. for Gastrointestinale og Parasitære Infektioner)

29. maj 2002

A: Hepatitis A
 B: Hepatitis B
 D: Difteri
 f: FSME/TBE

G: Gul feber
 J: Japansk encephalitis
 M: Meningokok A+C
 M*: Meningokok A+C+W135+Y

r: Rabies
 s: Tuberkulose
 T: Tyfus
 V: Myggestiksprofylakse

Q: Klorokin
 U: Klorokin + proguanil
 X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
 Z: Doxycyklin/Malarone