



## SYFILIS 2000-2001

### Laboratoriepåviste tilfælde

I 2000 og 2001 blev påvist i alt hhv. 54 og 51 syfilistilfælde, heriblandt to med medfødt syfilis. Dette er en markant stigning i forhold til 1999, hvor der blev påvist 34 tilfælde, EPI-NYT 34/00. Tallene omfatter såvel tidlige (varighed <2 år) som sene tilfælde, [tabel 1](#). Stigningen skyldes primært tilfælde hos mænd, blandt hvilke der i 2001 var en markant forskydning mod tidlig erhvervet syfilis.

**Tabel 1. Antal syfilistilfælde diagnosticeret i 2000-2001**

Diagnose	2000		2001	
	M	K	M	K
Erhvervet, tidlig	17	7	30	6
Erhvervet, sen	23	5	6	9
Medfødt	0	2	0	0
I alt	40	14	36	15

### Erhvervet syfilis

Tilfælde af erhvervet syfilis blev påvist i alle amter og som hidtil hyppigst, 40%, i Københavns Kommune, [tabel 2](#).

**Tabel 2. Antal erhvervede syfilistilfælde fordelt på amt for påvisning af diagnose, 2000-2001**

Amt	2000-2001	
	M	K
Københavns Kommune	32	9
Frederiksberg Kommune	2	1
Københavns	9	4
Frederiksborg	2	0
Roskilde	2	0
Vestsjællands	1	0
Storstrøms	0	1
Bornholms	0	1
Fyns	6	1
Sønderjyllands	1	3
Ribe	4	1
Vejle	3	1
Ringkøbing	0	2
Århus	6	0
Viborg	1	0
Nordjyllands	7	3
I alt	76	27

I alt blev 32% af tilfældene påvist i almen praksis, 40% i offentlige kønssygdomsklinikker og 22% i sygehuses sengeafdelinger, [tabel 3](#).

Af [tabel 4](#) fremgår, at 54% af mændene og 41% af kvinderne var født i Danmark, det sidste er en stigning fra 20% i 1998-99. De udenlandske fødesteder var efter hyppighed: Europa, Asien, Afrika, Nordamerika og Sydamerika. Smitteland var uoplyst for 58% af pa-

tienterne, [tabel 5](#). Modsat 1998-99, var der oplysning om smitte i Danmark. Smitte i udlandet var efter hyppighed: Europa, Asien og Afrika. Patienternes aldersfordeling fremgår af [tabel 6](#).  
Antal påviste syfilistilfælde hos gravide var 11 i 1996, 12 i 1997, 11 i 1998, seks i 1999, seks i 2000 og fire i 2001, [tabel 7](#).

**Tabel 3. Antal erhvervede syfilistilfælde fordelt på diagnosticeringssted, 2000-2001**

Sted	2000-2001	
	M	K
Almen praksis	26	7
Hudlægepraksis	3	1
Anden speciallægepraksis	2	0
Off. kønssygd. klinik	32	9
Andet off. ambulatorium	0	0
Sengeafdeling på sygehus	13	10
I alt	76	27

**Tabel 4. Antal erhvervede syfilistilfælde fordelt på fødested, 2000-2001**

Fødested	2000-2001	
	M	K
Danmark	41	11
Færøerne	0	0
Grønland	1	0
Udland	31	14
Uoplyst	3	2
I alt	76	27

**Tabel 5. Antal erhvervede syfilistilfælde fordelt på smitteland, 2000-2001**

Smitteland	2000-2001	
	M	K
Danmark	13	2
Færøerne	0	0
Grønland	0	1
Udland	20	7
Uoplyst	43	17
I alt	76	27

**Tabel 6. Antal erhvervede syfilistilfælde fordelt på alder, 2000-2001**

Alder (år)	2000-2001			
	Tidlig		Sen	
	M	K	M	K
0-19	2	0	1	0
20-24	4	2	2	2
25-29	3	7	4	4
30-39	15	3	9	2
40-49	10	0	2	1
50+	13	1	11	5
I alt	47	13	29	14

## Uge 26-33, 2002

**Tabel 7. Antal syfilistilfælde diagnosticeret hos gravide, 2000-2001**

Diagnose	Fødested	2000	2001
Tidlig	Danmark	3	0
	Udland	1	1
Sen	Danmark	0	1
	Udland	2	2
I alt		6	4

### Medfødt syfilis

De to tilfælde af medfødt syfilis var hhv. et adoptivbarn fra Indien og et barn født i Danmark af en herboende udenlandsk kvinde, som ikke var serologisk undersøgt for syfilis i graviditeten. Dette barn var medtaget, men blev først korrekt diagnosticeret og behandlet flere mdr. efter fødslen.

### Kommentar

Der er især sket en stigning i antal syfilistilfælde hos mænd, med en markant forskydning i 2001 mod tidlig erhvervet syfilis. Antal kvindelige patienter født i Danmark var stigende, og smitte fandt igen sted i Danmark. Det er påfaldende, at antal påviste tilfælde af syfilis hos gravide er faldet markant siden 1998, hvor selektiv screening af gravide blev indført i stedet for det hidtidige tilbud til alle. Langt færre gravide bliver således undersøgt. Det er også første gang siden 1989, at syfilis blev fundet hos et spædbarn født i Danmark. Endvidere er antal behandlede gravide faldet fra 12 i 1997 til fire i 2001. Det er derfor ikke usandsynligt, at der som følge af omlægningen i 1998 forekommer uopdaget intrauterin smitte, idet medfødt syfilis erfaringsmæssigt er en svær diagnose at stille, hvis man ikke har mistanken. (N. Axelsen, Klinisk Biokemisk afd.)

### ANMELDTE TILFÆLDE

Syfilis (erhvervet eller medfødt) skal anmeldes på formular 1510. I 2000-2001 blev i alt anmeldt 36 tilfælde af syfilis, svarende til 34% af diagnosticerede tilfælde. Ni var kvinder (25%) og 27 mænd (75%). Ni mænd og fire kvinder var anmeldt i 2000 og 17 mænd og seks kvinder i 2001. Hhv. tre og 13 mænd var homoseksuelle, for to var seksuel orientering uoplyst. I alt ni (56%) af de 16 homoseksuelle mænd var smittet i Danmark, seks i udlandet, mens smitteland for én mand var uoplyst. (E. Smith, G. H. Kock-Hansen, Epidemiologisk afdeling)

## Patienter med laboratoriepåvist klamydia fordelt på køn og amt

3. og 4. kvartal 2001

Amt	3. kvartal				4. kvartal			
	2001			2000	2001			2000
	M	K	I alt		M	K	I alt	
Kbh. + Frb. Kom.	276	524	801 *	643	243	484	728 *	725
Københavns	104	292	396	297	133	259	392	354
Frederiksborg	56	127	183	175	50	128	178	217
Roskilde	40	133	173	135	32	100	132	99
Vestsjællands	77	151	229 *	215	54	151	205	223
Storstrøms	54	111	165	115	43	77	121 *	123
Bornholms	1	13	14	22	1	14	15	16
Fyns	93	219	313 *	305	73	207	280	334
Sønderjyllands	77	241	319 *	200	36	88	124	169
Ribe	43	99	142	128	30	93	123	110
Vejle	67	156	223	231	70	165	235	225
Ringkøbing	55	121	176	186	64	118	183 *	205
Århus	101	387	489 *	552	194	369	563	625
Viborg	48	103	151	124	37	109	147 *	143
Nordjyllands	123	266	389	342	128	251	379	434
I alt	1215	2943	4163 *	3670	1188	2613	3805 *	4002

\*) For nogle personer var kønnet ukendt

## Patienter med laboratoriepåvist gonoré fordelt på køn og amt

1. kvartal 2002

Amt	1. kvartal			2001
	2002			
	M	K	I alt	
Kbh. + Frb. Kom.	40	8	48	30
Københavns	3	-	3	6
Frederiksborg	2	1	3	4
Roskilde	-	-	-	3
Vestsjællands	2	-	2	1
Storstrøms	1	-	1	3
Bornholms	1	1	2	-
Fyns	1	-	1	7
Sønderjyllands	3	1	4	2
Ribe	1	-	1	-
Vejle	2	-	2	5
Ringkøbing	-	-	-	2
Århus	7	-	7	6
Viborg	1	-	1	2
Nordjyllands	1	1	2	3
I alt	65	12	77	74