



VACCINATIONSFORSLAG VED UDLANDSREJSE

Uge 27b, 2014

EUROPA	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Albanien	A	A	A	ABs
Bosnien-Hercegovina	A	A	ABf	ABfs
Bulgarien	A	A	ABf	ABfrs
Estland		A	Af	ABfrs
Hviderusland	A	A	ABf	ABfrs
Kroatien		A	Af	ABfs
Letland		A	Af	ABfrs
Litauen		A	Af	ABfrs
Makedonien		A	Af	ABfs
Moldova	A	A	ABf	ABfrs
Montenegro		A	ABf	ABfs
Polen		A	Af	ABfrs
Rumænien	A	A	ABf	ABfrs
Rusland	A	A	Aj ⁷ 9Bf	Aj ⁷ 9Bfrs
Serbien		A	ABf	ABfs
Slovakiet		A	Af	ABfs
Slovenien		A	Af	ABf
Tyrkiet	A	Av ⁵ 9	Av ⁵ 9	ATBrsv ⁵ 9
alm. turistområder	A	A	A	ATBs
Tjekkiet		A	Af	ABf
Ukraine	A	A	ABf	ABfrs
Ungarn		A	Af	ABfs
CARIBIEN				
Anguilla (GB)	A	A	A	ATB
Antigua og Barbuda	A	A	A	ATB
Aruba	A	A	A	ATB
Bahamas	A	A	A	ATB
Barbados	A	A	A	ATB
Bermuda (GB)	A	A	A	ATB
Caymanøerne (GB)	A	A	A	ATB
Cuba	A	A	A	ATBr
Dominica	A	A	A	ATB
Dominikanske Republik	Av	Aq	ABq	ATBrsq
Grenada	A	A	A	ATB
Guadeloupe (FR)	A	A	A	ATB
Haiti	AX	AX	ABX	ATBrSX
Jamaica	A	A	A	ATB
Jomfruøerne (GB og USA)	A	A	A	ATB
Martinique (FR)	A	A	A	ATB
Montserrat	A	A	A	ATB
Nederlandske Antiller	A	A	A	ATB
Puerto Rico (USA)	A	A	A	ATB
Saint Kitts and Nevis	A	A	A	ATB
Saint Lucia	A	A	A	ATB
St. Vincent og Grenadinerne	A	A	A	ATB
Trinidad og Tobago	Ag*	Ag*	Ag*	Ag*TB
Turks- og Caicosøerne (GB)	A	A	A	ATB
MELLEM- og SYDAMERIKA				
Argentina	A	A	A	ATBs
Grænseomr. Bolivia, Brasilien og Paraguay	A	AG*V	AG*V	AG*TBsV
Belize	Av	Av	Abv	ATBrsv
Bolivia	Ag	Agq	AgBq	AgTBrsq
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX
Brasilien	A	Ag	AgB	AgTBrS
Amazonas	AGX	AGX	AGBX	AGTBrSX

Vaccinationsforslagene er let opdateret, se EPI-NYT 26/14 og 27a/14. Alle rejsende bør være vaccineret mod difteri og tetanus, symboler herfor er derfor ikke medtaget i tabellen.

Rejsen

Efter rejsens karakter er forslagene opdelt i fire kategorier:

1. Forretnings- eller kongresrejse af nogle dages varighed til hovedstad eller anden storby.
2. Arrangeret turistrejse af op til fire ugers varighed med dagsudflugter. Er rejsen af særlig art med mulighed for intens smitteudsættelse, kan **Gr 2** suppleres fra **Gr 3/4**, fx med B ved seksuel kontakt med lokale, T ved udtalt dårlig hygiejne, M ved tæt lokal personkontakt, j ved insekstekspostion (trekkingtur).
3. Individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsækrejse.
4. Langvarig individuel rejse i halve år, indvandrere på familiebesøg (uanset rejsens varighed), udstationering eller tilsvarende hyppigt gentagne besøg.

NB: Individualisering vil ofte forekomme.

Symbolernes typografi

STORE BOGSTAVER er brugt, når forslaget gælder alle rejsende; små bogstaver, når der er tale om begrænset anvendelse.

Malariaprofylakse er fremhævet med **fed skrift** og er placeret sidst i de enkelte kolonner. Således henviser f, g, j, r, s til vaccination af udvalgte rejsende, og **v, q, x, z** henviser til risiko for malaria i en mindre del af landet, se www.ssi.dk/rejser.

Sæsonvariation er angivet med **tal**. Når risikoen er begrænset til en del af året, typisk regntiden, er den aktuelle periodes første og sidste måned anført hhv. øverst og nederst efter bogstavet, fx Afghanistan **x**⁵₁₁.

Bemærk, at regntiden kan variere fra år til år, og at tallene derfor kun er vejledende.

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprofylakse

Q: Klorokin
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Chile	A	A	A	ATBs
Colombia	Ag*	Ag*x	Ag*Bx	Ag*TBrsx
Amazonas	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Costa Rica	A	Av	ABv	ATBrv
Ecuador	A	Ag*x	Ag*Bx	Ag*TBrsx
Amazonas	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Galapagosøerne	A	A	A	ATB
El Salvador	A	Av	ABv	ATBrsv
Fransk Guyana	AG	AGx	AGBx	AGTBrsx
Guatemala	A	Aq	ABq	ATBrsq
Guyana	AG	AGx	AGBx	AGTBrsx
Honduras	AV	Aq	ABq	ATBrsq
Mexico	A	Av	ABv	ATBrsv
Nicaragua	Aq	Aq	ABq	ATBrsq
Panama	A	AGx	AGBx	AGTBrsx
Paraguay	AG	AGq	AGq	AGTBrsq
Peru	A	Ag*q	Ag*Bq	Ag*TBrsq
Amazonas (Loreto)	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Surinam	AG	AGx	AGBx	AGTBrsx
Uruguay	A	A	A	ATBs
Venezuela	Ag*	Ag*q	Ag*Bq	Ag*TBrsq
Amazonas, Bolivar	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Margarita	A	A	A	ATB
OCEANIEN				
Carolinerne	A	A	AB	ATBs
Christmas Island (AU)	A	A	AB	ATBs
Cocos Islands(AU)	A	A	AB	ATBs
Cookøerne	A	A	AB	ATBs
Fiji	A	A	AB	ATBs
Fransk Polynesien	A	A	AB	ATBs
Guam (USA)	A	A	AB	ATBs
Kiribati	A	A	AB	ATBs
Mikronesien	A	A	AB	ATBs
Nauru	A	A	AB	ATBs
Niue	A	A	AB	ATBs
Nordmarianere	A	A	AB	ATBs
Ny Kaledonien (FR)	A	A	AB	ATBs
Papua Ny Guinea	AX	AX	ABX	ATBsX
Pitcairn	A	A	AB	ATBs
Salomonøerne	AX	AX	ABX	ATBsX
Samoa	A	A	AB	ATBs
Tokelau (NZ)	A	A	AB	ATBs
Tonga	A	A	AB	ATBs
Tuvalu	A	A	AB	ATBs
Vanuatu	AX	AX	ABX	ATBsX
Wake Island (USA)	A	A	AB	ATBs
Wallis og Futunaøerne (FR)	A	A	AB	ATBs
AFRIKA				
Algeriet	A	Av	ABv	ATBrsv
Angola	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Benin	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsX
Botswana	A	Ax ¹¹ ₆	ABx ¹¹ ₆	ATBrsx ¹¹ ₆
Burkina Faso	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsX
Burundi	AGX	AGX	AGBx	AGTBrsX
Cameroun	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsX
Centralafrikanske Rep.	AGX	AGMX	AGMBX	AGMTBrsX
Chagosøerne (GB)	A	A	AB	ATBs

Symbolforklaring

A: Hepatitis A (fra 1 år). Anbefales til alle indvandrerbørn født i DK, EPI-NYT 35/02. Immunoglobulin kan gives til børn < 1 år.

B: Hepatitis B (fra fødslen). Revaccination anbefales ikke, EPI-NYT 11/13.

f: Centraleuropæisk hjernebetændelse (FSME/TBE), ved regelmæssig færden i græsklædt vegetation i løvskovsområder i sommerhalvåret.

g/G: Gul feber (fra 9 måneder).

g/G*: Gul feber evt. kun ved særlig risiko. Se under de enkelte lande på www.ssi.dk/rejser.

j: Japansk encephalitis (fra 2 mdr.), EPI-NYT 37/09, 6/12 og 10/13.

M: Meningokoksygdom A+C+W135+Y (fra 1 år, evt. fra 2 mdr., EPI-NYT 10/13). Obligatorisk ved pilgrimsrejse til Mekka, EPI-NYT 38/13.

r: Rabies.

s: Tuberkulose. BCG til børn (fra fødslen) og unge til høj-endemiske områder, hvis der er længerevarende tæt kontakt til lokal befolkning, der lever under dårlige kår. Evt. ved længerevarende erhvervs-mæssig eksposition.

T: Tyfus. Injektion fra ca. 2 år, ved særlig risiko fra 18 mdr. Kapsler fra ca. 5 år. Indvandrere på besøg hos slægt og venner foreslås vaccineret uanset varighed.

Malariaproylaxse:

V: Meget lille risiko, myggestikproylaxse tilstrækkeligt.

Q: Klorokin, alternativt **V** eller **X**, alt efter smitterisiko.

X: Meflokin, Malarone eller doxycyklin.

Z: Doxycyklin eller Malarone.

Grundvaccination af børn og personer, der ikke har modtaget de almindelige børnevaccinationer, EPI-NYT 2/11.

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande, EPI-NYT 6/11.

Udvalgte insektoverførte virus-sygdomme, EPI-NYT 6/12.

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikproylaxse

Q: Klorokin
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Comorerne	AX	AX	ABX	ATBrS X
Congo	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Dem. Rep. Congo (Zaire)	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Djibouti	AX	AX	ABX	ATBrS X
Egypten	A	A	AB	ATBrS
Elfenbenskysten	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Eritrea	Ag* X	Ag* M X	Ag* M B X	Ag* M TBrS X
Asmara	A	AM	AMB	AMTBrS
Etiopien	Ag* X	Ag* M X	Ag* M B X	Ag* M TBrS X
Addis Abeba	AG	AGM	AGMB	AGMTBrS
Gabon	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Gambia	AGM X	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Ghana	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Guinea	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Guinea-Bissau	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Kap Verde	A	Av ⁸ ₁₁	ABv ⁸ ₁₁	ATBsv ⁸ ₁₁
Kenya	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Nairobi	Ag*	Ag*	Ag*B	Ag* T BrS
Lesotho	A	A	AB	ATBrS
Liberia	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Libyen	A	A	AB	ATB
Madagaskar	AX	AX	ABX	ATBrS X
Malawi	AX	AX	ABX	ATBrS X
Mali	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Marokko	A	A	AB	ATBrS
Mauretanien	Ag x	Ag x	AgB x	AgTBrS x
Mauritius	A	A	AB	ATBs
Mayotte (FR)	AX	AX	ABX	ATBrS X
Mozambique	AX	AX	ABX	ATBrS X
Namibia	A	A x	AB x	ATBrS x
Niger	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Nigeria	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Réunion (FR)	A	A	AB	ATBrS
Rwanda	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
São Tomé og Príncipe	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Senegal	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Seychellerne	A	A	AB	ATBs
Sierra Leone	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
Somalia	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Sudan	Ag X	Ag M X	Ag M B X	Ag M TBrS X
Swaziland	A x	A x	AB x	ATBrS x
Sydafrikanske Republik	A	A x	AB x	ATBrS x
Sydsudan	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Tanzania	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Tchad	Ag X	Ag M X	Ag M B X	Ag M TBrS X
Togo	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Tunesien	A	A	AB	ATBrS
Uganda	AGX	AGM X	AGMB X	AGMTBrS X
Zambia	Ag* X	Ag* X	Ag* B X	Ag* T BrS X
Zimbabwe	AX	AX	ABX	ATBrS X
Harare, Bulawayo	A	A	AB	ATBrS
Ækvatorialguinea	AGX	AGX	AGB X	AGTBrS X
ASIEN				
Afghanistan	A	A(T) x ⁵ ₁₁	ATB x ⁵ ₁₁	ATBrS x ⁵ ₁₁
Arabiske Emirater	A	A	AB	ATBr
Armenien	A	A	AB	ATBrS
Aserbajdsjan	A	Av ⁶ ₁₀	ABv ⁶ ₁₀	ATBrsv ⁶ ₁₀

Koleravaccination

Vaccination foreslås ikke til beskyttelse mod almindelig rejsedia-ré. Vaccination kan være relevant ved ophold i områder med udbrud af kolera.

Særlige myndighedskrav

Nogle lande kræver vaccination mod gul feber for alle rejsende, se www.who.int/ith. Ophold/transit i lande, hvor gul feber kan forekomme, kan også medføre vaccinationskrav senere på rejsen (gul feber transmissionszone, se www.ssi.dk/rejser).

WHO anbefaler ikke revaccination af tidligere gul feber vaccinerede, EPI-NYT 26a/13.

Meningokok-vaccination mod gruppe A+C+W135+Y kræves ved pilgrimsrejse til Saudi-Arabien fra 2-års-alderen (børn fra 3 mdr. til 2 år mod gr. A), EPI-NYT 38/13. Der er enkelte andre nye landekrav, se EPI-NYT 27a/14.

Malariaprophylakse

Primær forebyggelse af myggestik med balsam/net/spray er altid vigtig ved ophold i et malariaområde. Her omtales fire forskellige medikamentelle profylakseregimer: Klorokin bør kun anvendes i områder med *P. vivax*, og hvor der ikke er risiko for *P. falciparum*. Midlet tåles af gravide og børn.

Meflokin er effektivt over for *P. falciparum* i Afrika, men ikke alle steder i SØ-asien. Ifølge WHO kan meflokin anvendes til profylakse i hele graviditeten, i 1. trimester kun på tvingende indikation. Meflokin bør ikke anvendes profylaktisk til børn under 3 mdr. eller som vejer under 5 kg, ej heller til personer med epilepsi, tidligere neuropsykiatrisk lidelse eller til personer, der skal dykke. Meflokin bør startes 3 uger før afrejse.

Malarone er effektivt over for *P. falciparum*. Resistens ses meget sjældent. Malarone bør ikke anvendes til gravide og ammende kvinder, EPI-NYT 26a/13.

Doxycyklin er effektivt over for *P. falciparum*. Doxycyklin er kontraindiceret til gravide efter 10. graviditetsuge og til børn < 12 år,

Q: Klorokin

X: Meflokin/Malarone/doxycyklin

Z: Doxycyklin/Malarone

A: Hepatitis A

B: Hepatitis B

f: FSME/TBE

g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko

j: Japansk encephalitis

M: Meningokok A+C+W135+Y

r: Rabies

s: Tuberkulose

T: Tyfus

(T): Tyfus >2 uger

V: Myggestikprofylakse



	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4
Bahrain	A	A	AB	ATBs
Bangladesh	Av	A(T)x	Aj⁵₁₀TBrx	Aj⁵₁₀TBrsx
Dhaka	A	A(T)	Aj ⁵ ₁₀ TBr	Aj ⁵ ₁₀ TBrS
Bhutan	A	A(T)x	Aj⁶₁₀TBrx	Aj⁶₁₀TBrsx
Brunei	A	AV	AjBv	AjTBsv
Cambodja	Av	AZ	Aj⁵₁₀BrZ	Aj⁵₁₀TBrSZ
Angkor Wat, Tonle Sap	A	AV	Aj⁵₁₀Brv	Aj⁵₁₀TBrsv
Filippinerne	A	Ax	AjBx	AjTBrsx
Georgien	A v⁶₁₀	Av⁶₁₀	ABv⁶₁₀	ATBrsv⁶₁₀
Indien, nord	AV	A(T)v	Aj⁵₁₀TBrv	Aj⁵₁₀TBrsv
Indien, mellem-øst	AV	A(T)x	Aj⁵₁₀TBrx	Aj⁵₁₀TBrsx
Indien, syd og vest inkl. Goa	AV	A(T)v	AjTBrv	AjTBrsv
Indonesien	A	Ax	AjBx	AjTBrsx
Papua	AX	AX	AjBx	AjTBsx
Bali, Java (turistomr.)	A	A	AjB	AjTBs
Irak	A	AT	ATB	ATBrS
Iran	A	Ax³₁₁	ABx³₁₁	ATBrsv³₁₁
Israel	A	A	AB	ATBr
Japan			j⁷₁₀B	j⁷₁₀B
Jordan	A	A	AB	ATBr
Kasakstan	A	A	AB	ATBrS
Kina, nord for 25. br.grad	A	A	Aj ⁶ ₁₀ B	Aj ⁶ ₁₀ TBrS
Kina, syd for 25. br.grad	A	Aq	Aj⁶₁₀Bq	Aj⁶₁₀TBrSq
Hainan, Yunnan	Ax	Ax	Aj⁶₁₀Bx	Aj⁶₁₀TBrSx
Hong Kong	A	A	AB	ATBs
Macao	A	A	AB	ATB
Kirgisistan	A	Av⁶₁₀	ABv⁶₁₀	ATBrsv⁶₁₀
Kuwait	A	A	AB	ATBs
Laos	Av	AX	Aj⁶₉Bx	Aj⁶₉TBrSx
Vientiane	A	A	Aj ⁶ ₉ B	Aj ⁶ ₉ TBrS
Libanon	A	A	AB	ATBr
Malaysia	A	Ax	AjBx	AjTBrsx
Sabah og Sarawak	A	Ax	AjBx	AjTBsx
Maldiverne	A	A	AB	ATBs
Mongoliet	A	A	AB	ATBrS
Myanmar (Burma)	A	AZ	Aj⁵₁₀BrZ	Aj⁵₁₀TBrSZ
Nepal	A	A(T)v	Aj⁶₁₀TBrv	Aj⁶₁₀TBrsv
Nordkorea	A	Av	Aj⁵₁₀Bv	Aj⁵₁₀TBrsv
Oman	A	Av	ABv	ATBrv
Pakistan	AX	A(T)x	Aj⁵₁₀TBrx	Aj⁵₁₀TBrsx
Qatar	A	A	AB	ATB
Saudi-Arabien	A	Ax⁹₁	ABx⁹₁	ATBs⁹₁
Mekka (pilgrimsrejse)	AM	AM	AMB	AMTBs
Singapore	A	A	AB	ATBs
Sri Lanka	A	A(T)x	AjTBrx	AjTBrsx
Sydkorea	A	Av	Aj⁵₁₀Bv	Aj⁵₁₀Bsv
Syrien	A	A	AB	ATBrS
Taiwan	A	A	Aj ⁵ ₁₀ B	Aj ⁵ ₁₀ TBs
Tadsjikistan	A	Av⁶₁₀	ABv⁶₁₀	ATBrsv⁶₁₀
Thailand	A	Az	Aj⁵₁₀Brz	Aj⁵₁₀TBrsz
alm. turistområder	A	Av	Aj⁵₁₀Brv	Aj⁵₁₀TBrsv
Turkmenistan	A	A	AB	ATBrS
Usbekistan	A	Av⁵₉	ABv⁵₉	ATBrsv⁵₉
Vietnam	A	Az	Aj⁵₁₀Bz	Aj⁵₁₀TBrsz
Yemen	Av	Ax	ABx	ATBrsx
Østtimor	AX	AX	AjBx	AjTBrsx

EPI-NYT 19/05 og 26a/13.
Profylakse til børn, EPI-NYT 19/05.

Selvbehandling af malaria

Selvbehandling kan i almindelighed ikke erstatte medikamentel forebyggelse eller eksakt diagnostik. Inden start af malariabehandling bør man så vidt muligt undersøges af læge og ved mikroskopisk af blodudstryk.

Ved ophold i mere afsides liggende malariaområder, hvor der er mere end 24-48 timer til nærmeste lægehjælp, kan det anbefales, at den rejsende medgives malariamedicin til selvbehandling som et supplement til forebyggelsen. Der bør vælges et middel, der ikke er indgået i profylaksen:

Har man anvendt meflokin, doxycyklin eller klorokin, evt. kombineret med proguanil, foreslås Malarone (voksne: 4 tabletter dagligt i tre dage). Har man anvendt Malarone selvbehandles med meflokin (voksne: 3 tabletter som engangsdosis efterfulgt af én tablet 6-8 timer senere).

Rejsemedicin på Internettet

Aktuel information om udbrud og mere detaljeret information om de enkelte lande og sygdomme kan fx søges her:

www.ssi.dk/rejser

www.um.dk

www.who.int/ith

www.cdc.gov/travel

www.promedmail.org

(C.S. Larsen, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, A.H. Christiansen, Afdeling for Infektionsepidemiologi).

2. juli 2014

A: Hepatitis A
B: Hepatitis B
f: FSME/TBE
g/G: Gul feber

g/G*: Gul feber evt. kun v/ særlig risiko
j: Japansk encephalitis
M: Meningokok A+C+W135+Y
r: Rabies

s: Tuberkulose
T: Tyfus
(T): Tyfus >2 uger
V: Myggestikprofylakse

Q: Klorokin
X: Meflokin/Malarone/doxycyklin
Z: Doxycyklin/Malarone