


Diagram 1. Tetanusprofylakse ved sårskade hos børn på 0-9 år



Diagram 2. Tetanusprofylakse ved sårskade hos børn på 10 -17 år




* Vaccine til revaccination kan anvendes til primærvaccination af 10-17-årige børn, EPI-NYT 5a/15

** TIG= tetanus immunoglobulin. Når der gives TIG i forbindelse med start eller færdiggørelse af en primær vaccinationsserie, skal der gives en ekstra dosis tetanusholdig vaccine en måned efter. Ren tetanusvaccine er ikke længere tilgængelig

*** Normalt i form af DiTeKiPol/Hib primærvaccine, evt. som DTP/DTaP-vaccine eller diTekiPol-vaccine

**** Typisk på skadestuer. Hvis der primært er givet diTe-vaccine, gives diTekiPol-revaccination efter 1 måned, ellers omvendt

Diagram 3. Tetanusprofylakse ved sårskade hos personer ≥ 18 år



* Revaccination kan anvendes til primærvaccination af voksne ≥ 18 år , EPI-NYT 5a/15

** TIG= tetanus immunglobulin. Når der gives TIG i forbindelse med start eller færdiggørelse af en primær vaccinationsserie, skal der gives en ekstra dosis tetanusholdig vaccine en måned efter. Ren tetanusvaccine er ikke længere tilgængelig

*** Normalt i form af DiTeKiPol/Hib primær vaccine, evt. som DTP/DTaP-vaccine eller diTeKiPol-revaccination