

والدین گرامی،

تولد نوزادتان را به شما تبریک می‌گوییم.

از آنجایی که شما ناقل ویروس هپاتیت ب هستید، فرزندتان واکسن هپاتیت ب و ایمونوگلوبولین هپاتیت ب را بلافاصله پس از تولد دریافت کرد تا ریسک انتقال بیماری از مادر به نوزاد کاهش یابد.

به منظور اطمینان از اینکه فرزندتان در برابر عفونت هپاتیت ب محافظت می‌شود، علاوه بر واکسن‌هایی که در برنامه واکسیناسیون استاندارد دوران کودکی وجود دارد، یک سری واکسن هپاتیت ب رایگان در مطب پزشک عمومی شما ارائه خواهد شد.

هنگامی که نوزادتان 1 ماهه شد، نوبتی نزد پزشک عمومی خود بگیرید تا واکسن هپاتیت ب بعدی را دریافت کند. پس از آن، نوزادتان به 2 واکسن دیگر نیاز خواهد داشت.

در موارد نادر ممکن است عفونت هپاتیت ب در کودکانی که واکسینه شده‌اند نیز مشاهده شود. به همین دلیل، دو ماه پس از دریافت واکسن، نوزاد باید آزمایش خون بدهد (به عنوان مثال در نوبت واکسیناسیون 15 ماهگی).

لطفاً نوبتی نزد پزشک عمومی خود بگیرید تا اطمینان حاصل شود فرزندتان واکسیناسیون و آزمایش‌ها را طبق ترتیب زیر دریافت کند:

سن	واکسیناسیون	آزمایش کودکی
1 ماهگی (به عنوان مثال در آزمایش 5 هفتگی)	1 HBV	√
2 ماهگی	1 HBV	
3 ماهگی	دیفتری-کزاز-سیاهسرفه-فلج اطفال-هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+PCV ²	
5 ماهگی	دیفتری-کزاز-سیاهسرفه-فلج اطفال-هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+PCV ²	√
12 ماهگی	دیفتری-کزاز-سیاهسرفه-فلج اطفال-هموفیلوس آنفلوآنزا نوع ب+PCV ²	√
15 ماهگی	آزمایش MMR3 و هپاتیت ب	
2 سالگی		√
3 سالگی		√
4 سالگی	3 MMR	√
5 سالگی	دیفتری-کزاز-سیاهسرفه-واکسن فلج اطفال	√
12 سالگی	4 HPV (دو بار)	

1 واکسن هپاتیت ب. 2 واکسن پنوموکوکال. 3 واکسن سرخک-اوربیون و سرخچه. 4 ویروس پاپیلوما‌ی انسانی

در پوشه زیر می‌توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با مراقبت در دوران کودکی و برنامه واکسیناسیون کودکان دانمارک به دست آورید:

افراد تازه در کشور خارجی. توصیه‌های مفید در رابطه با سلامت کودکان.

ارائه‌شده به زبان‌های زیر: افغانستانی، انگلیسی، عربی و سومالی.

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-i-et-fremmed-land>