



Vaccination af borgere med særlig risiko for pneumokoksygdom

Der findes to vacciner mod pneumokokvaccination - PPV23 (Pneumovax) og PCV13 (Prevenar).

- PPV23 beskytter mod 23 typer pneumokokker. Alle de nævnte risikogrupper i oversigten nedenfor anbefales at blive vaccineret med PPV23, og vaccinationen er gratis.
- PCV13 beskytter mod 13 typer pneumokokker. PCV13 anbefales kun til borgere i særlig høj risiko. Der er mulighed for klausuleret tilskud.

Risikogrupper	PPV23	PCV13
Borgere med forhøjet risiko eller som er omfattet af det gratis vaccinationstilbud grundet COVID-19: <ul style="list-style-type: none">• Raske personer på 65 år og derover• Beboere på plejehjem eller botilbud	Vaccination hvert 6. år 1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.	Anbefales ikke.
Borgere med forhøjet risiko: <ul style="list-style-type: none">• Borgere på 65 år og derover med kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom eller diabetes mellitus	Vaccination hvert 6. år 1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.	Anbefales ikke.
Borgere i særlig høj risiko: <ul style="list-style-type: none">• Særlige risikogrupper under 18 år*• Manglende milt eller dysfunktion af milten• Immunsuppression• Liquorlækage• Tidligere invasiv pneumokoksygdom• Cochlear implantation• Stamcelletransplantation• Organtransplantation	Vaccination hvert 6. år 1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling. Revaccination inden 6 år Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, så <u>kan</u> der laves en antistofmåling efter 3-5 år og herefter eventuelt fremskynde revaccination.	Anbefales. Der gives klausuleret tilskud. 1 dosis PCV13. <u>Ingen revaccination.</u>

Læs mere om vaccinationsprogrammet på ssi.dk/pneumokok



Når borgeren skal have begge vacciner

Er borgeren tidligere vaccineret med PPV23?

Ja

1 dosis PCV13 minimum ét år efter tidligere vaccination med PPV23.

Nej

1 dosis PCV13. Efter minimum 8 uger gives der 1 dosis PPV23.

* For uddybende information om særlige risikogrupper under 18 år - se ssi.dk/pneumokok