

Tabel 1 Diagnostik af HCV infektion

Klinisk mistanke	Anti-HCV	HCV RNA	HCV RNA (3 mdr.)	HCV RNA (6 mdr.)	Tolkning
Ingen symptomer eller symptomer og ingen risiko for smitte indenfor 6 måneder.	-	-			Ingen HCV infektion
Akut leverbetændelse eller subklinisk infektion	-	+			Akut HCV infektion ¹ mulig smitte indenfor 2-3 mdr.
	+	+			Akut HCV infektion ¹
Kronisk leverbetændelse					
Immunkompetent	+	+			Kronisk HCV infektion ^{1,2}
Immunkompromitteret	- ³	+			Kronisk HCV infektion ^{1,2}
Spontan helbredelse eller behandlet	+	-	-	-	Overstået infektion eller behandlingseffekt ⁴

Anti: antistof

- 1) Meget sjældent kan HCV RNA viræmi være intermitterende eller være under detektionsgrænsen.
- 2) Kronisk hepatitis C er defineret ved tilstedeværelsen af HCV RNA i blod i mere en 6 måneder (akut infektion varer sjældent mere en 6 måneder, hvor HCV RNA fortsat kan påvises, men ikke altid er udtryk for kronisk infektion).
- 3) Ved immunkompromitteret (fx HIV inficeret med lav immunforsvar eller dialysepatienter) kan anti-HCV antistof ikke påvises eller kan give et inkonklusivt svar.
- 4) Ved behandlingseffekt tages HCV RNA 1, 3 og 6 måneder efter behandlingen er ophørt.