


# FAKTA om livmoderhalskræft

HPV står for Human Papiloma Virus. Der findes mere end 100 HPV-typer. 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV-typerne 16 og 18.

## HPV-smitte


Over 80 % af alle seksuelt aktive mænd og kvinder vil på et tidspunkt være smittet med HPV.



Langt de fleste vil ikke mærke, at de er smittet med HPV, og smitten vil forsvinde af sig selv igen.

## Celleforandringer


I 2015 fik ca. **15.000** konstateret celleforandringer.



Hos nogle bliver infektionen med HPV kronisk og forårsager celleforandringer, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

## Keglesnit


I 2015 fik ca. **6.000** foretaget et keglesnit.



Ved svære celleforandringer skal man have et såkaldt keglesnit, hvor en del af livmoderhalsen fjernes. Ved en efterfølgende graviditet er der en øget risiko for at føde for tidligt.


## Livmoderhalskræft

I 2015 fik **380** kvinder konstateret livmoderhalskræft.



Bliver celleforandringerne ikke opdaget i tide, kan de udvikle sig til livmoderhalskræft.

## "The Family destroyer"



Livmoderhalskræft rammer hyppigst yngre kvinder, der skal igennem svære behandlingsforløb med operation, stråler og/eller kemoterapi. Op til 1/4 dør af sygdommen til trods for behandling.


Antal kvinder fordelt på alder der i en 5-årig periode fra 2010-2014 fik konstateret livmoderhalskræft. Kilde: Nordcan

## Behandling af livmoderhalskræft

Behandlingen af livmoderhalskræft afhænger af, hvor meget sygdommen har spredt sig og vil bestå af operation og/eller strålebehandling og kemoterapi.

### Operation

Hos nogle er det tilstrækkeligt med keglesnit, andre skal have fjernet hele livmoderen, vævet ved siden af livmoderen og lymfeknuder. Det er ikke sikkert, at kvindens evne til at få børn kan bevares. Operation kan bl.a. give ansamlinger af lymfevæske i benene og problemer med vandladning.



### Kemoterapi og strålebehandling

Hvis det ikke er muligt eller tilstrækkeligt at operere, fx pga spredning til andre organer, vil man få strålebehandling og/eller kemoterapi. Strålebehandling kan bl.a. give en række gener i tarmen og blæren, tidlig overgangsalder og problemer ved sex. Kemoterapi kan bl.a. give kvalme, hårtab og nedsat hørelse.



**99 kvinder** dør hvert år af livmoderhalskræft til trods for behandling