Håndtering af barn født af hepatitis B-positiv mor

Fødegang:
Barn født af HBV-positiv mor får:
immunglobulin
og
HBV-vaccination ved fødsel

Egen læge:
Vaccination når barnet er:
1 måned
2 måneder
12 måneder

Egen læge:
1 måned efter endt vaccinations-serie på i alt 4 vacciner skal barnet testes for:
HBsAg, **HBc-antistof** og **HBs-antistof**

HBsAg

Hvis **positiv**: Barnet er smittet – henvis til specialafdeling

Hvis **negativ**: Barnet er ikke smittet

HBc-Antistof

Hvis **positiv**: Barnet er enten smittet in utero, men har clearet infektionen selv, eller barnet har stadig maternelle antistoffer. Ny prøve når barnet er > 2 år. Hvis positiv > 2 år: Henvis til specialafdeling til vurdering.

Hvis **negativ**: Barnet er ikke smittet.

HBs-Antistof

Hvis **positiv** >10 IE/mL: Barnet har dannet antistoffer mod hepatitis B, og er livslangt beskyttet.

Hvis **negativ** eller <10 IE/mL: giv endnu én vaccination og mål efter 1 måned.

Såfremt den fortsat er **negativ** eller <10 IE/mL, henvis til vurdering på specialafdeling.

STATENS SERUM INSTITUT

7. Marts 2018