

# Screening for kronisk Hepatitis B virus (HBV)



## Personer med risiko for HBV der oftest ses i almen praksis

- Børn født af mødre med kronisk hepatitis B
- Alle indvandrere fra områder uden for Nordeuropa
- I.v. stofbrugere
- Seksualpartnere til personer med kronisk hepatitis
- Husstandsmedlemmer til personer med kronisk hepatitis B
- Patienter med forhøjet ALAT (>50 IU/l mænd og 35 IU/l kvinder)
- Mænd der har sex med mænd



Måling af HBsAG



Hvis positiv



Henvisning til infektionsmedicinsk- eller gastromedicinsk afd.  
afhængig af lokal instruks.

## Vær også opmærksom på disse grupper i almen praksis

### Personer med risiko for HBV der oftest screenes i hospitals- eller ambulant regi

- Mænd der har sex med mænd
- Personer med Down's syndrom, også hjemmeboende
- Alle beboere i institutioner for udviklingshæmmede, der bor under husstandslingnende forhold sammen med personer med kronisk hepatitis B
- Patienter i kronisk dialysebehandling
- Patienter med hæmofili, som har modtaget faktorpræparater før effektiv varmebehandling (1984)
- Patienter forud for behandling med biologiske stoffer (fx monoclonale antistoffer, TNF-alfa- og interleukin 1 blokerende behandling)
- Patienter forud for kemoterapi
- Hepatitis C-positive patienter
- HIV-positive patienter
- Patienter med cirrose
- Patienter med primær lever cancer

### Klinisk sygdom

Ved mistanke om klinisk sygdom og/eller akut hepatitis B i almen praksis henvises til "tabel 1 Serologisk tolkning og DNA" under Hepatitis B på SSI's hjemmeside.

Patienter med klinisk sygdom og/eller nyopdaget hepatitis B virus skal under alle omstændigheder henvises til eller som minimum konfereres med specialafdeling afhængig af lokal instruks.