



## Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer UVI

Dato	Type af ændring	Overordnet emne	Kommentar	Hvor i tidl. Udgave	Tekst i tidl. udgave	Ændret til
Marts 2015 Udg. 1.1  Rettelser til udg. 1. 2014	Mindre sproglig ændring	Bakteriuri ved anvendelse af uridom	Dette er en mindre sproglig ændring med fjernelse af misvisende rater for bakteriuri ved anvendelse af uridom (80-90 %). Den angivne ratebygger på et enkelt lille studie, hvor man anvendte uridom hele døgnet i længere tid, hvilket ikke er anbefalingen her.	Side 10	Urininkontinens disponerer til UVI. Anvendelse af uridom indebærer høj forekomst af bakteriuri (80-90 %), men ikke så høj som ved blærekateter	Urininkontinens disponerer til UVI. Anvendelse af uridom indebærer øget forekomst af bakteriuri og UVI, men ikke så høj som ved blærekateter
			Dette er en mindre sproglig ændring med fjernelse af misvisende rater for bakteriuri ved anvendelse af uridom (80-90 %). Den angivne ratebygger på et enkelt lille studie, hvor man anvendte uridom hele døgnet i længere tid, hvilket ikke er anbefalingen her.	Side 14	Uridom indebærer høj forekomst af bakteriuri (80-90 %) men ikke så høj som ved blærekateter	Anvendelse af uridom indebærer øget forekomst af bakteriuri og UVI, men ikke så høj som ved blærekateter